

Trop de cellules

Que faire ?



Important : le nettoyage des trayons et l'utilisation du gobelet-trayeur sont indispensables

- Contrôle de la technique et de l'hygiène de traite
- Stimulation des trayons 40 à maximum 90 sec. (PAS DE TRAITE A SEC)
- Faire contrôler l'installation de traite par l'installateur
- **Entretien du bétail, affouragement et climat**
 - Nettoyage des couches, maintien de la litière et de la place de traite propres
 - Tondre les mamelles, les queues et les panses
 - Optimiser l'alimentation et l'abreuvement
- **Hygiène et traite correctes**
 - Mains, habits, bottes, chaise à traire et ustensiles doivent être propres
 - Tirage des premiers jets de lait, test de Schalm, nettoyage et trempage des trayons
- **Diminution de la pression d'infection**
 - Faire le test de Schalm. Les vaches positives sont à traire en dernier.
 - Pour les vaches positives au test de Schalm, faire effectuer une analyse bactériologique par le vétérinaire.
 - Eliminer les vaches avec des blessures ou des infections inguérissables.

L'application rigoureuse de ces mesures conduit au succès.

Pour plus d'informations : www.casei.ch

Votre équipe de conseillers de CASEI :

- Hugo Baeriswyl 079 250 92 20
- Hanspeter Kappeler 079 215 10 13
- Andreas Salzmänn 078 890 36 35